BIOCEPAIL PROTOCOLLO PER PAZIENTE ORTODONTICO

PRIMA DEL BONDING

Almeno 15 giorni prima del posizionamento dei brackets è bene sospendere l'utilizzo di sostanze contenenti Fluoro per ridurre il rischio di distacco degli stessi. Quindi utilizzare per l'igiene orale quotidiana Biorepair[®] Plus Protezione Totale.



DURANTE LA TERAPIA

Subito prima del bonding effettuare un deplaquing con Biorepair® Plus Protezione Totale.

Nel corso della terapia ortodontica, seduta bimestrale di 30 minuti dedicata a motivazione, deplaguing e Biorepair® Trattamento d'Urto per 10 minuti (per prevenire il rischio di demineralizzazione/white spot nelle aree che contornano i brackets).

Aggiungere alle pratiche di igiene orale quotidiana Biorepair® Plus Collutorio Trattamento Intensivo, per una maggiore azione antibatterica.



DOPO IL DEBONDING

Al debonding: seduta di igiene orale professionale a cui aggiungere Biorepair® Trattamento d'Urto per 10 minuti.

A casa effettuare applicazioni di Biorepair[®] Trattamento d'Urto per 10 minuti per 7/10 giorni. Ripetere il ciclo di applicazioni una volta al mese. Se necessario proseguire per 6 mesi.

Igiene orale quotidiana con Biorepair® Protezione Totale come dentifricio, a cui aggiungere, se necessario per una maggiore azione antibatterica, Biorepair® Plus Collutorio Trattamento Intensivo.



Redatto in collaborazione con il Dr. A. Butera

Cossellu G, Lanteri V, Butera A, Sarcina M, Farronato G Effects of six different preventive treatments on the shear bond strength of orthodontic brackets: in vitro study.